

DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE (TB) DANS LES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE ET LES MAISONS DE RETRAITE

Dépistage de la TB active : Liste de contrôle à l'intention des cliniciens

RAPPEL : Les clients âgés ne présentent pas toujours les signes et symptômes classiques de la TB active. Il faut tenir compte de la TB dans le diagnostic différentiel chez les clients qui ne s'épanouissent pas bien et qui sont atteints de fatigue inexplicée.

SYMPTÔME	OUI	NON	REMARQUES
Toux qui perdure plus de 3 semaines			
Hémoptysie			
Fièvre			
Sueurs nocturnes			
Perte de poids non intentionnelle			
Anorexie			
Douleur thoracique			
Dyspnée			

Chapitre 3 des Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse (7^e édition) : Le symptôme classique de la TB pulmonaire active est une toux chronique qui perdure pendant au moins 2 ou 3 semaines. Cette toux est d'abord sèche, mais devient productive après quelques semaines ou quelques mois. Une toux d'une durée de 2 semaines est un critère plus sensible, mais une toux qui perdure pendant 3 semaines sera plus spécifique. Le choix d'une durée de 2 ou 3 semaines comme critère dépendra de l'expérience locale et de l'épidémiologie de la TB. La fièvre et les sueurs nocturnes sont courantes, mais peuvent être absentes chez les très jeunes enfants et les personnes âgées. L'hémoptysie, l'anorexie, la perte de poids, les douleurs thoraciques et les autres symptômes se manifestent généralement lorsque la maladie est plus avancée.

RÉSULTATS DE LA RADIOGRAPHIE PULMONAIRE	OUI	NON	REMARQUES
Cavités			
Infiltrats			
Nodules			
Épanchement pleural			
Adénopathie hilare et médiastinale			
Changements des apex pulmonaires			
Masses			
Perte de volume			
Fibrose			
Granulomes			

REMARQUE : Si les résultats de l'examen des symptômes ou de la radiographie sont préoccupants, commander une culture et trois échantillons d'expectorations pour une recherche de bacilles acido-alcool-résistants (BAAR) à collecter à intervalles d'au moins huit heures, pour écarter la possibilité d'une TB active. Se référer aux plus récentes Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse pour des renseignements concernant le dépistage et le diagnostic.