

LIGNES DIRECTRICES SUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES À L'INTENTION DES ÉCOLES ET DES ÉTABLISSEMENTS DE GARDE D'ENFANTS - TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE

MALADIE	CAUSE/SYMPÔMES	TRANSMISSION	INCUBATION	PÉRIODE DE CONTAGION	EXCLUSION	EXIGENCES DE DÉCLARATION
Cinquième maladie (Parvovirus B19)	<ul style="list-style-type: none"> - Cause : Virus. - La maladie est bénigne, habituellement sans fièvre - Éruption distinctive qui ressemble aux traces d'une gifle sur la joue. - Suivie d'une éruption symétrique (1 à 4 jours plus tard, sur les bras et le corps; peut se décolorer pour revenir et durer de 1 à 3 semaines). 	<ul style="list-style-type: none"> - De personne à personne par les sécrétions respiratoires. - De la mère au fœtus. 	<ul style="list-style-type: none"> - De 4 à 14 jours, mais peut durer jusqu'à 21 jours. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plus contagieuse avant la survenue de l'éruption et probablement non transmissible après celle-ci. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire puisque la maladie n'est plus infectieuse après la survenue de l'éruption. - Conseiller aux femmes enceintes et aux enfants infectés qui souffrent de drépanocytose ou autres formes d'anémie chronique de consulter leur médecin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire. - Pour en savoir plus, visitez le site www.soinsdenosenfants.cps.ca
Conjonctivite bactérienne (« Pink Eye »)	<ul style="list-style-type: none"> - Cause : Bactérie. - Conjonctivite purulente : conjonctivite (blanc de l'œil) rose ou rouge avec écoulement blanc ou jaune (pus). - Parfois de la fièvre. 	<ul style="list-style-type: none"> - De personne à personne. - Œil sain qui entre en contact avec les sécrétions d'un œil infecté. - Il est important de se laver les mains souvent pour enrayer la contamination. 	<ul style="list-style-type: none"> - De 24 à 72 heures. 	<ul style="list-style-type: none"> - La durée de l'infection ou à la suite d'un traitement efficace aux antibiotiques pendant 24 heures. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pour une infection bactérienne ou peut-être bactérienne, exclure jusqu'à ce que l'enfant soit traité avec une crème ou des gouttes antibiotiques pendant 24 heures. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire. - Pour en savoir plus, visitez le site www.soinsdenosenfants.cps.ca
Conjonctivite virale (« Pink Eye »)	<ul style="list-style-type: none"> - Cause : Virus. - Conjonctivite non purulente : conjonctivite rose avec écoulement séreux clair; absence de fièvre, de douleur oculaire ou de rougeur des paupières. - Peut être accompagnée d'un rhume. 	<ul style="list-style-type: none"> - De personne à personne : œil sain qui entre en contact avec les sécrétions d'un œil atteint. 	<ul style="list-style-type: none"> - De 12 heures à 12 jours. 	<ul style="list-style-type: none"> - La durée de l'infection. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire s'il n'y a pas d'écoulements - À considérer si une bonne hygiène de main ne peut pas être garantie. Autrement, l'enfant peut retourner sur l'autorisation d'un fournisseur de soins de santé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire. - Pour en savoir plus, visitez le site www.soinsdenosenfants.cps.ca
Coxsackie (Maladie mains pieds bouche)	<ul style="list-style-type: none"> - Cause : Virus. - Infection virale aiguë qui se soigne toute seule. - Apparition soudaine de fièvre, mal de gorge. - Une éruption cutanée survient habituellement sur la paume des mains, les doigts, dans la bouche et sur la plante des pieds. - L'atteinte aiguë se manifeste habituellement chez les enfants, en particulier pendant les mois d'été. 	<ul style="list-style-type: none"> - De personne à personne par le contact direct avec le liquide des plaies, les sécrétions respiratoires et la voie oro-fécale. - Bien qu'il se manifeste plus souvent chez les jeunes enfants, les adultes asymptomatiques peuvent aussi le propager 	<ul style="list-style-type: none"> - Généralement de 3 à 5 jours. 	<ul style="list-style-type: none"> - Particulièrement durant la première semaine de la maladie lorsque la personne présente des symptômes). - Le risque de transmission par les selles ou les sécrétions de la gorge peut persister pendant plusieurs semaines. - L'hygiène des mains est importante. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire. - Pour en savoir plus, visitez le site www.soinsdenosenfants.cps.ca
Grippe (Influenza)	<ul style="list-style-type: none"> - Cause : Virus d'influenza A ou B. - Infection des voies respiratoires menant à de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, de l'écoulement nasal, un mal de gorge et une toux. - Les enfants peuvent aussi avoir la nausée, des vomissements et la diarrhée. 	<ul style="list-style-type: none"> - De personne à personne par contact direct avec les sécrétions respiratoires ou le contact indirect avec des surfaces ou des objets contaminés. 	<ul style="list-style-type: none"> - De 1 à 3 jours. 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 heures avant le début des symptômes. - Jusqu'à 7 jours chez les jeunes enfants. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exclure pendant 5 jours après l'apparition des symptômes OU jusqu'à la fin de la fièvre et quand on se sent mieux. 	<ul style="list-style-type: none"> - Déclarer en 1 jour ouvrable au 613-933-1375 ou au 1 800 267-7120. - Déclarer les flambées immédiatement.
Impétigo	<ul style="list-style-type: none"> - Cause : Bactérie. - Inflammation cutanée, provoquée par les bactéries streptococcus /staphylococcus. - Apparaît habituellement sur le visage ou la peau exposée et se manifeste comme éruption cutanée par des regroupements de bosses rouges ou de cloques. - Peuvent se remplir de liquide et former une croûte. 	<ul style="list-style-type: none"> - De personne à personne par contact direct ou indirect avec les lésions. - Très contagieux et doit être traité immédiatement. - Se propage rapidement, en particulier si le malade se gratte. - L'hygiène des mains est très importante pour empêcher la propagation. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variable. - En moyenne 4 à 10 jours. 	<ul style="list-style-type: none"> - Du début de l'éruption jusqu'à 24 heures de traitement avec un antibiotique oral ou topique - Habituellement jusqu'à ce que les cloques forment une croûte 	<ul style="list-style-type: none"> - Jusqu'à ce que les lésions soient complètement croûtées ou jusqu'au moins 24 heures après le début du traitement. - Au retour, toutes cloques ouvertes qui suintent doivent être couvertes d'un bandage propre et sec 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire. - Pour un supplément d'information, aller à www.soinsdenosenfants.cps.ca
Oxyures vermiculaires	<ul style="list-style-type: none"> - Cause : Vers. - Démangeaisons autour de l'anus. - Irritabilité. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les œufs d'oxyures vermiculaires se transmettent à d'autres personnes par voie oro-fécale. - Litière, aliments ou vêtements contaminés. - L'hygiène des mains est très importante. 	<ul style="list-style-type: none"> - De 4 à 8 semaines. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendant la période d'incubation, jusqu'au début du traitement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jusqu'au début du traitement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire. - Pour un supplément d'information aller à www.soinsdenosenfants.cps.ca
Teigne	<ul style="list-style-type: none"> - Cause : Champignons (mycète). - Plaques décolorées, annulaires, aplaties et qui s'étendent sur la peau. - Elles peuvent être sèches et écailleuses ou humides (moites) et croûteuses. - Les démangeaisons sont communes. 	<ul style="list-style-type: none"> - De personne à personne par contact direct avec la peau. - Propagation indirecte par les mains, les objets et les surfaces contaminées. 	<ul style="list-style-type: none"> - Habituellement de 10 à 14 jours. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tout au cours de la maladie ou jusqu'au début du traitement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jusqu'au début du traitement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas nécessaire. - Pour un supplément d'information aller à www.soinsdenosenfants.cps.ca
Varicelle	<ul style="list-style-type: none"> - Cause : Virus. - Fièvre, éruptions vésiculeuses (ampoules) qui surviennent par poussées successives, des gales après la phase vésiculeuse. Des « taches » apparaissent habituellement sur le corps, la figure et le cuir chevelu d'abord, et ensuite sur les bras et les jambes. - Des gales apparaissent ensuite et remplacent les ampoules. 	<ul style="list-style-type: none"> - De personne à personne par contact direct avec du liquide s'écoulant des vésicules ou des gouttelettes de sécrétions respiratoires. - Indirectement par un contact avec des objets et des surfaces nouvellement contaminées. 	<ul style="list-style-type: none"> - De 10 à 21 jours, habituellement 14 à 16 jours. 	<ul style="list-style-type: none"> - De 1 à 2 jours avant l'éruption cutanée jusqu'à ce qu'une croûte se forme (habituellement environ 5 jours à la suite de l'éruption). 	<ul style="list-style-type: none"> - Recommandée jusqu'à ce que la croûte se forme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Déclarer le nombre de cas et l'âge des enfants à chaque semaine par la poste ou par télécopieur au 613-933-7930.

