

SUIVI D'UNE INFECTION TRANSMISE SEXUELLEMENT GONORRHÉE

La gonorrhée est une infection à déclaration obligatoire en vertu du Règlement de l'Ontario 559/91, tel que modifié, pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Ces renseignements sont nécessaires pour l'enquête/la gestion de cas et la surveillance locale.

INSTRUCTIONS : CONFIRMER LES RENSEIGNEMENTS DU CLIENT et retourner le **FORMULAIRE DUMENT REMPLI** au BSEO par télécopie confidentielle au 613-933-7417.

Clinicien chargé du diagnostic : _____ Date du test positif : _____
(AAAA/MM/JJ)

Formulaire rempli par (imprimé) : _____ Retourner le formulaire par télécopieur à : _____

RENSEIGNEMENTS DU CLIENT – CONFIRMÉS :

Nom : _____ DDN : _____ Sexe : _____
(AAAA/MM/JJ)

Adresse : _____

Courriel : _____ Téléphone : _____

TRAITEMENT (selon le Guide de dépistage et de traitement de la gonorrhée en Ontario, 2e édition de Santé publique Ontario)

TRAITEMENT DE PREMIÈRE LIGNE (Test de contrôle recommandé)

Ceftriaxone 500mg IM dose unique

Date de l'ordonnance : (AAAA/MM/JJ) _____

TRAITEMENT DE SECONDE LIGNE (exécuter le test de contrôle)

Autre traitement des infections anogénitales

Céfixime 800mg PO + Doxycycline 100mg PO BID pendant 7 jours

- Ce régime est recommandé en cas de résistance aux macrolides ou contre-indication à l'utilisation des macrolides.
- La doxycycline est contre-indiquée chez les personnes enceintes et allaitantes.

Date de l'ordonnance : (AAAA/MM/JJ) _____

Autre traitement des infections pharyngées

Céfixime 800mg PO + Azithromycine 1g PO dose unique

Date de l'ordonnance : (AAAA/MM/JJ) _____

CONSULTATION CLIENT EFFECTUÉE

Avisé d'un résultat positif

Il est conseillé de s'abstenir de tout contact sexuel pendant 7 jours après le traitement

Il est conseillé de s'abstenir de toute activité sexuelle avec un ou plusieurs contacts sexuels non traités

Informé qu'un retraitement est nécessaire si des vomissements surviennent dans l'heure suivant la prise d'Azithromycine

Un test de contrôle est recommandé *

***Un test de contrôle (TDC) est recommandé pour tous les sites NG positifs dans tous les cas.**

Ceci est particulièrement important lorsque des thérapies autres que la ceftriaxone 500 mg IM sont utilisées. Se reporter à la section sur le test de contrôle du guide pour traiter la gonorrhée pour en savoir plus sur le moment d'administrer le TDC.

- Si le test de contrôle est effectué de 3 à 21 jours après la fin du traitement, une culture est recommandée quel que soit l'état des symptômes du patient.
- Si le test de contrôle est effectué 21 jours après la fin du traitement et que le patient est
 - Asymptomatique - les TAAN sont recommandés
 - Symptomatique - la culture et les TAAN sont recommandés

RECHERCHE DES CONTACTS (depuis les 3 derniers mois ou les derniers connus si plus de 3 mois sont passés)

Il est conseillé au client d'informer ses contacts sexuels de la nécessité d'un test et d'un traitement pour les ITS; ET

Le client a été informé que le BSEO le contactera pour recueillir des informations sur les contacts sexuels et effectuer la recherche des contacts.

FACTEURS DE RISQUE

Bris du condom

Diagnostiqué au moment de la pose du DIU (stérilet)

Diagnostiqué au moment de l'avortement thérapeutique

Plus d'un contact sexuel au cours des 6 derniers mois

Nouveau contact sexuel au cours des 2 derniers mois

Aucun condom utilisé

Partenaire(s) du sexe opposé

Parent d'un nouveau-né

Enceinte (Nombre de semaines : _____)

Reçoit une prophylaxie préexposition

Partenaire(s) du même sexe

Travaille dans le domaine du sexe

Victime d'agression sexuelle

Autre : _____

RAISON DU TEST

Client est un contact sexuel d'un cas positif

Routine

Symptômes : _____

NOTES

LE BSEO CONTACTERA TOUS LES CLIENTS INFECTÉS PAR LA GONORRHÉE.



BSEO.ca • 613 933-1375 • 1 800 267-7120



Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0.